

USE OF BARICITINIB IN HOSPITALISED ADULTS WITH COVID-19

استخدام BARICITINIB للبالغين المصابين بـ COVID-19 الذين يحتاجون لدخول المستشفى

معلومات للمرضى والعائلات ومقدمي الرعاية

تتضمن نشرة المعلومات هذه معلومات عن دواء baricitinib عند استخدامه لمعالجة COVID-19.

ما هي الفوائد المحتملة لـ BARICITINIB في معالجة COVID-19؟

ينتمي baricitinib إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات (Janus Kinase (JAK)). ويعمل baricitinib على تخفيف نشاط أنزيم يدعى Janus Kinase الذي يسبب التهابات ويؤثر على وظيفة جهاز المناعة. يخفف baricitinib الالتهابات وتأثيرات النشاط المفرط لجهاز المناعة التي يمكن حصولها عند الإصابة الشديدة بـ COVID-19، ويُرجَّح أن يقلل من مخاطر الوفاة.

وقد تمت الموافقة على استخدام baricitinib في أستراليا لمعالجة بعض الحالات المرضية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والإكزيما. والاسم التجاري لهذا الدواء هو Olumiant.

وقد تمّت في آخر التجارب الإكلينيكية دراسة مدى فعالية baricitinib لمعالجة COVID-19، وبنتيجتها أصدرت [National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce](https://www.nswtag.org.au/resources-for-experimental-medicines-for-the-treatment-of-covid-19/) الأسترالية توصيات بشأن حالات الإصابة بـ COVID-19 التي يُحتمل على الأغلب أن يشكّل baricitinib علاجاً فعالاً لها.

ما الذي ينبغي أخذه بالاعتبار عند استخدام BARICITINIB لمعالجة COVID-19؟

نظراً إلى أن baricitinib يُستخدم حديثاً كعلاج لـ COVID-19 وإلى أنه ليس مسجلاً لمعالجة COVID-19 في أستراليا، يتم حالياً جمع المعلومات عن مدى فعاليته ومدى أمانه. ومن المهم أن يفهم المرضى ومقدمي الرعاية لهم الحالات التي يمكن أن يفيد baricitinib في معالجتها وأسباب ذلك. وسوف يقدم لك أطباؤك المزيد من المعلومات عن مدى فعالية هذا الدواء وأمانه لحالتك المرضية.

ونظراً إلى أن baricitinib يُستخدم حديثاً لمعالجة COVID-19، من المهم أن تعطي موافقتك الرسمية قبل أن تتلقّى baricitinib. ويمكنك دائماً العدول عن رأيك بشأن المعالجة بـ baricitinib وسحب موافقتك في أي وقت كان.

ما الذي ينبغي أن أخبر الطبيب به قبل استخدام BARICITINIB لمعالجة COVID-19؟

يجب أن يعلم الطبيب ما يلي:

أية حالات صحية أخرى لديك بما فيها نقص كريات الدم البيضاء، ونقص كريات الدم الحمراء، والإصابة بمرض السل (بما في ذلك مخالطة شخص مصاب بالسل)، وحالات العدوى المتكرّرة، و HIV أو AIDS، والتهاب الكبد B أو التهاب الكبد C، وهربس النطاق (زئار النار)، والسكري، والسرطان، وارتفاع الكولسترول، والتجلطات الدموية في أوعية رجليك الدموية (تجلّط الأوردة العميقة) أو الرئتين (الانصمام الرئوي)

أية مشاكل صحية في الكبد أو الكلى

ردات الفعل التحسّسية السابقة ضد أي دواء

جميع الأدوية بما فيها الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والأدوية المكملّة كالفيتامينات أو المعادن أو العلاجات العشبية أو الطبيعية التي تأخذها أو أخذتها مؤخراً

احتمالية وجود حمل أو خطط للحمل

التلقيحات الأخيرة أو خططك لأخذ لقاح

ما هي الآثار الجانبية لـ BARICITINIB؟

لجميع الأدوية آثار جانبية. بعض هذه الآثار خطيرة ولكن في معظم الأحيان لا تكون خطيرة، والعديد منها يزول مع مرور الوقت أو بعد التوقف عن أخذ العلاج. وقد تلزم المعالجة الطبية لبعض الآثار الجانبية؛ ويُحتمل أن لا يعاني المريض من آثار جانبية. توجد أدناه بعض الآثار الجانبية المحتملة التي قد يعاني منها المريض خلال معالجة COVID-19 بـ baricitinib. ويُحتمل حصول آثار جانبية أخرى غير معروفة لـ baricitinib عند استخدامه لمعالجة المصابين بـ COVID-19.

الآثار الجانبية المحتملة لـ baricitinib	ما يجب أن تفعله
<ul style="list-style-type: none"> • الغثيان (خاصة عند بداية المعالجة) • ألم في البطن • وجع في الرأس 	أخبر الطبيب أو الممرضة عند حصول هذه الأعراض لمساعدتك على معالجتها.
<ul style="list-style-type: none"> • نقص في كريات الدم البيضاء • نقص في كريات الدم الحمراء • تأثيرات على الكبد 	سوف يراقب الطبيب هذه الآثار الجانبية بواسطة فحوصات الدم.
<ul style="list-style-type: none"> • حالات مرضية بسبب العدوى: <ul style="list-style-type: none"> ◦ نزلة برد، ألم في الحلق، رشح أو انسداد في الأنف، سعال ◦ حمى، تعرّق/قشعريرة برد، ألم في العضلات، ضيق في التنفس، سخونة/احمرار/ألم في الجلد، تقرّحات في الجسم، حرقة عند التبول، التبول مراراً أكثر من العادة. ◦ أعراض هربس النطاق (زئار النار) كوجع الرأس، أو الحساسية للضوء، أو التنميل، أو طفح جلدي يستدعي الحكّة أو مؤلم مع تقرّحات. 	أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أيّ من هذه الأعراض.
<ul style="list-style-type: none"> • تجلطات دموية في الرجلين أو الرئتين (انتفاخ مؤلم في الرجلين، ألم في الصدر أو ضيق في التنفس). 	أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أيّ من هذه الأعراض.
<ul style="list-style-type: none"> • ردود فعل تحسّسية: <ul style="list-style-type: none"> ◦ ضيق في التنفس، أزيز في التنفس، صعوبة في التنفس ◦ تورّم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أعضاء أخرى من الجسم ◦ طفح جلدي شديد، حكاك، الشرى 	أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أيّ من هذه الأعراض.

يرجى الملاحظة: ما جاء أعلاه ليس قائمة كاملة بجميع الآثار الجانبية المحتملة. يوجد رابط إلكتروني يتضمن المزيد من المعلومات عن الآثار الجانبية لـ baricitinib في آخر نشرة المعلومات هذه. كذلك بوسع الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة تزويدك بقائمة أوسع عن الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى الطبيب مباشرة و/أو إلى Therapeutic Goods Administration على الموقع www.tga.gov.au/reporting-problems.

كيف يتم إعطاء BARICITINIB؟

يؤخذ Baricitinib بابتلاع القرص مع كوب من الماء. ويمكن أخذه مع الطعام أو بدون طعام. يقرر طبيبك الجرعة المناسبة لك والمدة التي يجب أن تستمر فيها بأخذ الجرعة.

هل توجد محاذير خاصة بعلاج BARICITINIB؟**استخدام هذا الدواء مع أدوية أخرى؟**

قد يتفاعل Baricitinib مع بعض الأدوية الأخرى، وأحياناً قد يكون هذا التفاعل خطيراً. لذا ينبغي إخبار الأطباء وغيرهم من المختصين الصحيين (كالصيادلة أو الممرضة) بجميع الأدوية التي تأخذها عادةً أو التي تخطط لأخذها. يشمل ذلك الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والأدوية المكملّة، كالفيتامينات والمعادن أو العلاجات العشبية والطبيعية. وسوف يتفقد الطبيب والصيادلة تفاعلات الأدوية قبل البدء بأخذ baricitinib وعند التوقف عن أخذه.

التلقيحات

نظراً إلى أن baricitinib يمكن أن يخفض نشاط جهاز المناعة، قد تحصل حالات مرضية نتيجة العدوى. سوف يتفقد الأطباء الحالات المرضية الناجمة عن العدوى ويعطونك نصيحة عن التلقيحات المقبلة المناسبة لك. احرص على إخبار الأطباء بأية تلقيحات أخذتها مؤخراً.

الخصوبة، الحمل والإرضاع من الثدي

- لا يُنصح بأخذ baricitinib إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة ومصابة بـ COVID-19. استشير طبيبك أو الصيدلي للحصول على معلومات ونصائح بهذا الشأن.
- تأثير baricitinib على الخصوبة غير معروف.
- بصورة عامة، تُنصح النساء في سنّ الحمل باستخدام وسائل مناسبة لمنع الحمل لأسبوع على الأقل بعد آخر جرعة من baricitinib. استشير طبيبك للمزيد من المعلومات.

ملاحظات:

المزيد من المعلومات عن BARICITINIB

- Eli Lilly Australia Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information Olumiant® baricitinib 4 mg film-coated tablet blister pack. Therapeutic Goods Administration. Published 23 April 2021
https://search.tga.gov.au/s/search.html?collection=tga-artg&profile=record&meta_i=277917
- National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with COVID-19 <https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines>

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc

إخلاء من المسؤولية: لقد تم توفير هذه الوثيقة للمعلومات فقط، وهي سارية المفعول وقت نشرها. ويمكن تحديث المعلومات بانتظام ويُصح بتحميل الوثيقة من موقع NSW TAG عند لزومها لمريض أو مقدم رعاية أو أفراد عائلة. ولا تشمل هذه الوثيقة كل المعلومات المتوفرة، ولا تحل محل المشورة الطبية لذا ينبغي عدم استخدامها حصرياً لتحديد الخيارات أو القرارات العلاجية الفعلية.