

USE OF REMDESIVIR IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19

REMDESIVIR在新冠病毒（COVID-19）住院患者中的应用

患者、家属与照顾者须知

本信息单张包括了有关称为remdesivir的药物用于治疗 COVID-19 的重要信息。

REMDESIVIR治疗COVID-19可能有什么益处？

Remdesivir是一种新的抗病毒药物，在澳大利亚已临时注册用于治疗COVID-19。Remdesivir通过阻止引起COVID-19的病毒在体内繁殖而发挥作用。对于中度至重度COVID-19患者，remdesivir可能有助于患者较快恢复，并降低死亡风险。

Remdesivir的品牌名称是Veklury®。

最近的临床试验研究了remdesivir对COVID-19的疗效。澳大利亚的 [National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce](#) 对于remdesivir用于治疗COVID-19什么时候最可能有效、什么时候无效提出了建议。

用REMDESIVIR治疗COVID-19的时候应考虑什么问题？

由于remdesivir是新的抗病毒药物，并且在澳大利亚用于治疗COVID-19只是临时（不是完全）注册，因此有关其疗效和安全性的信息尚有待收集。患者及其照顾者必须了解 remdesivir 什么时候有效、为什么有效。医生将针对您的病情为您提供更多关于其疗效和安全性的信息。

由于用remdesivir治疗COVID-19是新疗法，所以在使用remdesivir之前，您必须正式表示同意。您可以随时改变自己在使用remdesivir治疗的看法并撤回同意。

在用REMDESIVIR治疗COVID-19之前，医生应该了解什么情况？

医生应了解以下情况：

- 任何肝病或肾病
- 任何其他疾病，包括糖尿病、心脏病、血液疾病、癫痫或癫痫发作
- 以前对任何药物的过敏反应
- 正在服用或最近曾经服用的所有药物，包括非处方药和补充药物，如维生素、矿物药、草药或自然疗法药物
- 怀孕的可能性或计划

REMEDESIVIR有什么副作用?

所有药物都有副作用。有时副作用很严重，但大多数情况下并不严重，而且许多副作用会随着时间的推移或停止治疗而消失。有一些副作用可能需要治疗。副作用也可能不会出现。在使用remdesivir治疗期间可能出现的一些副作用如下所示。当remdesivir用于COVID-19患者时，有可能遇到其他未知的副作用。因为remdesivir是一种新药，所以会对使用remdesivir的患者密切监护。

Remdesivir可能产生的副作用	怎么处理
恶心、呕吐、腹泻、头痛、皮疹	如果出现这些症状，请告诉医生或护士，他们可以帮助治疗。
对肝脏的影响	医生会通过验血来观察这些副作用。
使用remdesivir时可能发生的反应包括低血压、恶心、呕吐、出汗、颤抖。 注射部位疼痛、出血、皮肤瘀伤、酸痛、肿胀、可能发生感染	医生和/或护士将观察这些副作用。

请注意：这并不是所有可能的副作用的完整清单。因为remdesivir是一种新药，所以副作用必须直接向医生，或者在网上向Therapeutic Goods Administration报告：www.tga.gov.au/reporting-problems，或者向两方面都报告

REMEDESIVIR治疗有没有什么特别的注意事项?

与其他药物一起使用必须注意

由于remdesivir是一种新药，关于它与其他药物可能发生的相互作用信息有限。与所有药物一样，remdesivir有可能与其他药物发生相互作用，造成严重后果。所有通常服用或打算服用的药物，包括诸如维生素、矿物质、草药或自然疗法药物等非处方药和补充药物，都应该告诉医生和其他医务人员（如药剂师或护士）。

在开始使用remdesivir之前和停止使用时，医生和药剂师会检查潜在的药物相互作用。

在儿童或青少年中使用

关于remdesivir在儿童或青少年中使用的信息非常少。在决定是否推荐使用remdesivir时，您的医生会考虑疾病的严重程度、儿童的年龄和体重。

生育、怀孕和母乳喂养

- Remdesivir对生育能力的影响尚不清楚。
- 关于remdesivir用于孕妇和哺乳期妇女，需要进一步的信息。只有在认为可能得到的益处大于对母亲或婴儿的风险时，才会考虑使用。请向医生和药剂师咨询以获得信息和建议。
- 建议在remdesivir治疗期间停止母乳喂养。请向医生和药剂师咨询以获得信息和建议。

REMDESIVIR如何给药?

- Remdesivir由医生或护士通过静脉缓慢输入体内，每天一次，通常持续5天。缓慢输入（也称为输液）可能需要30至120分钟，将在医院环境中进行。
- 您的医生会决定适合您的剂量和给药次数。

我的笔记：

关于REMDESIVIR的更多信息

- Gilead Sciences Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information – Veklury® (Remdesivir) Concentrate for Injection. Therapeutic Goods Administration. Published July 2020. <https://search.tga.gov.au/s/search.html?query=remdesivir&collection=tga-artg&profile=record>
- National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with COVID-19. <https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines>

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc

免责声明：本文件只是提供信息。这些信息在本文发表时是有效的，但可能会定期更新，患者、照顾者和家属个人需要使用时建议从NSW TAG网站下载该文件。文中并没有包括所有的现有信息，并不打算取代医疗建议，不应该单单依靠这个文件来作出实际的治疗选择或作出其他决定。