

USE OF REMDESIVIR IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19

DÙNG THUỐC REMDESIVIR NƠI CÁC BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO COVID-19

THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

Tập thông tin này gồm có thông tin quan trọng về thuốc remdesivir khi được dùng trong việc chữa trị COVID-19.

ÍCH LỢI TIỀM TÀNG CỦA REMDESIVIR CHO VIỆC CHỮA TRỊ COVID-19?

Remdesivir là một thuốc mới để chống siêu vi và được tạm thời đăng ký để chữa trị COVID-19 tại Úc. Remdesivir tác dụng bằng cách ngăn chặn siêu vi gây ra COVID-19 khỏi sinh sôi trong cơ thể. Nếu quý vị nhiễm COVID-19 ở mức độ trung bình đến trầm trọng, remdesivir có thể giúp quý vị sớm khỏi bệnh và giảm nguy cơ tử vong.

Tên thương hiệu của remdesivir là Veklury®.

Các thử nghiệm lâm sàng gần đây đã khảo sát remdesivir tác dụng hữu hiệu ra sao nơi các ca COVID-19. [National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce](#) (Lực lượng Chứng cứ Lâm sàng COVID-19 Toàn quốc) của Úc đã khuyến nghị về việc khi nào thì remdesivir rất có thể hữu hiệu, hoặc không hữu hiệu, trong việc chữa trị COVID-19.

NHỮNG GÌ CẦN XEM XÉT KHI DÙNG REMDESIVIR NƠI CA NHIỄM COVID-19?

Bởi vì remdesivir là thuốc mới để chống siêu vi và được đăng ký tạm thời (chưa được đầy đủ) để chữa trị COVID-19 tại Úc, thông tin về việc thuốc này hữu hiệu và an toàn ra sao đang được thu thập. Điều quan trọng là bệnh nhân và người chăm sóc của họ hiểu được khi nào và tại sao remdesivir có thể hữu ích. Bác sĩ của quý vị sẽ cung ứng thêm thông tin về sự hiệu quả và an toàn của thuốc này đối với bệnh trạng của quý vị.

Bởi vì việc dùng remdesivir đối với COVID-19 là mới mẻ, điều quan trọng là quý vị cần nêu lên sự ưng thuận chính thức của mình trước khi nhận remdesivir. Quý vị luôn có thể đổi ý về việc chữa trị với remdesivir và rút lại ưng thuận bất cứ lúc nào.

NHỮNG GÌ BÁC SĨ CẦN BIẾT TRƯỚC KHI REMDESIVIR ĐƯỢC DÙNG TRONG VIỆC CHỮA TRỊ COVID-19?

Bác sĩ cần biết về việc quý vị có:

- vấn đề nào về gan hoặc thận
- bất cứ bệnh trạng gì kể cả tiểu đường, vấn đề về tim, rối loạn máu, động kinh hoặc co giật
- phản ứng dị ứng trước đây với bất cứ thuốc nào
- tất cả thuốc men kể cả thuốc mua qua quầy và thuốc bổ sung, ví dụ vitamins, khoáng chất, thảo dược hoặc thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic medicines) mà quý vị đang dùng hoặc gần đây đã dùng
- có thể có thai hoặc dự định có thai

CÁC TÁC DỤNG PHỤ CỦA REMDESIVIR GỒM NHỮNG GÌ?

Tất cả thuốc men đều có tác dụng phụ. Đôi khi các tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng thường là không nghiêm trọng, và nhiều tác dụng phụ sẽ biến mất qua thời gian hoặc khi dừng chữa trị. Có thể cần đến chữa trị y tế đối với một số tác dụng phụ. Quý vị có thể không gặp tác dụng phụ nào. Dưới đây là một số tác dụng phụ có thể gặp phải trong lúc chữa trị với remdesivir. Có khả năng gặp phải các tác dụng phụ chưa biết khác của remdesivir khi thuốc này được dùng nơi những người bị COVID-19. Vì remdesivir là thuốc mới, các bệnh nhân nhận được remdesivir sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Các tác dụng phụ khả hữu của remdesivir	Nên làm gì
Buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, nhức đầu, nổi mẩn	Hãy báo cho bác sĩ hoặc y tá biết nếu các triệu chứng này xảy ra và họ có thể giúp chữa trị.
Ảnh hưởng đến gan	Bác sĩ sẽ theo dõi xem có các tác dụng phụ này, bằng cách thử máu.
Các phản ứng có thể xảy ra khi dùng remdesivir kể cả hạ huyết áp, buồn nôn, ói mửa, đổ mồ hôi, và run rẩy. Chỗ chích trên da có thể bị đau, chảy máu, bầm, nhức, sưng và có thể nhiễm trùng.	Bác sĩ và/hoặc y tá sẽ theo dõi các tác dụng phụ này.

Vui lòng lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ của tất cả các tác dụng phụ khả hữu. Vì remdesivir là thuốc mới, điều quan trọng là trực tiếp báo cáo các tác dụng phụ đến bác sĩ và/hoặc đến Therapeutic Goods Administration (Cơ quan Quản trị Sản phẩm Trị liệu) tại www.tga.gov.au/reporting-problems.

CÓ CÁC ĐỀ PHÒNG ĐẶC BIỆT NÀO KHI CHỮA TRỊ VỚI REMDESIVIR?

Dùng với các Thuốc Khác

Vì remdesivir là thuốc mới, có khá ít thông tin về khả năng thuốc này có thể tương tác ra sao với các thuốc khác. Cũng như tất cả các thuốc men, có khả năng là remdesivir có thể tương tác với các thuốc khác dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng. Quý vị phải cho bác sĩ và các chuyên viên y tế khác (ví dụ dược sĩ, y tá) biết về tất cả các thuốc men thường dùng hoặc dự định dùng. Các thuốc này gồm cả các thuốc mua qua quầy và thuốc bổ sung chẳng hạn như vitamins, khoáng chất, dược thảo hoặc thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic medicines).

Bác sĩ và dược sĩ sẽ xem xét về các tương tác khả hữu của thuốc trước khi remdesivir được bắt đầu dùng và khi ngưng dùng.

Dùng nơi Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên

Có rất ít thông tin về việc dùng remdesivir nơi trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Bác sĩ của quý vị sẽ xem xét mức độ trầm trọng của bệnh, tuổi tác và cân nặng của trẻ khi quyết định có nên khuyên dùng remdesivir không.

Khả năng sinh sản, Thai kỳ và Cho con dùng sữa mẹ

- Chưa được biết về ảnh hưởng của remdesivir đối với khả năng sinh sản.
- Cần có thêm thông tin về việc dùng remdesivir nơi thai phụ và các phụ nữ đang cho con dùng sữa mẹ. Chỉ nên xét đến việc dùng thuốc nếu cho rằng lợi ích khả hữu sẽ vượt trội nguy cơ đối với bà mẹ hoặc em bé. Hãy hội ý với bác sĩ và dược sĩ để biết thông tin và hướng dẫn.
- Nên ngưng cho con dùng sữa mẹ trong lúc người mẹ được chữa trị với remdesivir. Hãy hội ý với bác sĩ và dược sĩ để biết thông tin và hướng dẫn.

REMDESIVIR ĐƯỢC CHO BẰNG CÁCH NÀO?

- Remdesivir được cho bởi bác sĩ hoặc y tá **MỘT LẦN** mỗi ngày bằng cách truyền chậm vào cơ thể qua tĩnh mạch, thường là trong 5 ngày. Việc tiêm chậm (còn gọi là truyền thuốc) có thể lâu khoảng từ 30 đến 120 phút và sẽ được thực hiện trong bối cảnh bệnh viện.
- Bác sĩ của quý vị sẽ quyết định liều lượng thích hợp cho quý vị, và việc quý vị cần nhận bao nhiêu liều.

Ghi chú của tôi:

THÔNG TIN THÊM VỀ REMDESIVIR

- Gilead Sciences Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information – Veklury® (Remdesivir) Concentrate for Injection. Therapeutic Goods Administration. Published July 2020.
<https://search.tga.gov.au/s/search.html?query=remdesivir&collection=tga-artg&profile=record>
- National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with COVID-19. <https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines>

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc

Không nhận trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin, và hiện hành vào lúc xuất bản. Tài liệu này có thể cập nhật định kỳ và người xem nên tải tài liệu từ trang mạng của NSW TAG khi cần sử dụng cho riêng bệnh nhân, người chăm sóc và gia đình. Tài liệu này không bao gồm tất cả các thông tin có sẵn. Tài liệu này cũng không nhằm để thay thế tư vấn y tế và không nên dùng duy nhất tài liệu này để cân nhắc các quyết định hoặc lựa chọn về việc chữa trị thực sự.