

USE OF REMDESIVIR IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19

REMDESIVIR在新冠病毒（COVID-19）住院患者中的應用

患者、家屬與照顧者須知

本資訊單張包括了有關稱為remdesivir的藥物用於治療 COVID-19 的重要資訊。

REMDESIVIR治療COVID-19可能有什麼益處？

Remdesivir是一種新的抗病毒藥物，在澳大利亞已臨時註冊用於治療COVID-19。Remdesivir通過阻止引起COVID-19的病毒在體內繁殖而發揮作用。對於中度至重度COVID-19患者，remdesivir可能有助於患者較快恢復，並降低死亡風險。

Remdesivir的品牌名稱是Veklury®。

最近的臨床試驗研究了remdesivir對COVID-19的療效。澳大利亞的 [National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce](#) 對於remdesivir用於治療COVID-19什麼時候最可能有效、什麼時候無效提出了建議。

用REMDESIVIR治療COVID-19的時候應考慮什麼問題？

由於remdesivir是新的抗病毒藥物，並且在澳大利亞用於治療COVID-19只是臨時（不是完全）註冊，因此有關其療效和安全性的資訊尚有待收集。患者及其照顧者必須瞭解 remdesivir 什麼時候有效、為什麼有效。醫生將針對您的病情為您提供更多關於其療效和安全性的資訊。

由於用remdesivir治療COVID-19是新療法，所以在使用remdesivir之前，您必須正式表示同意。您可以隨時改變自己對使用remdesivir治療的看法並撤回同意。

在用REMDESIVIR治療COVID-19之前，醫生應該瞭解什麼情況？

醫生應瞭解以下情況：

- 任何肝病或腎病
- 任何其他疾病，包括糖尿病、心臟病、血液疾病、癲癇或癲癇發作
- 以前對任何藥物的過敏反應
- 正在服用或最近曾經服用的所有藥物，包括非處方藥和補充藥物，如維生素、礦物藥、草藥或自然療法藥物
- 懷孕的可能性或計劃

REMDESIVIR有什麼副作用？

所有藥物都有副作用。有時副作用很嚴重，但大多數情況下並不嚴重，而且許多副作用會隨著時間的推移或停止治療而消失。有一些副作用可能需要治療。副作用也可能不會出現。在使用remdesivir治療期間可能出現的一些副作用如下所示。當remdesivir用於COVID-19患者時，有可能遇到其他未知的副作用。因為remdesivir是一種新藥，所以會對使用remdesivir的患者密切監護。

Remdesivir可能產生的副作用	怎麼處理
噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、皮疹	如果出現這些症狀，請告訴醫生或護士，他們可以幫助治療。
對肝臟的影響	醫生會通過驗血來觀察這些副作用。
使用remdesivir時可能發生的反應包括低血壓、噁心、嘔吐、出汗、顫抖。 注射部位疼痛、出血、皮膚瘀傷、酸痛、腫脹、可能發生感染	醫生和/或護士將觀察這些副作用。

請注意：這並不是所有可能的副作用的完整清單。因為remdesivir是一種新藥，所以副作用必須直接向醫生，或者在網上向Therapeutic Goods Administration報告：www.tga.gov.au/reporting-problems，或者向兩方面都報告

REMDESIVIR治療有沒有什麼特別的注意事項？

與其他藥物一起使用必須注意

由於remdesivir是一種新藥，關於它與其他藥物可能發生的相互作用資訊有限。與所有藥物一樣，remdesivir有可能與其他藥物發生相互作用，造成嚴重後果。所有通常服用或打算服用的藥物，包括諸如維生素、礦物藥、草藥或自然療法藥物等非處方藥和補充藥物，都應該告訴醫生和其他醫務人員（如藥劑師或護士）。

在開始使用remdesivir之前和停止使用時，醫生和藥劑師會檢查潛在的藥物相互作用。

在兒童或青少年中使用

關於remdesivir在兒童或青少年中使用的資訊非常少。在決定是否推薦使用remdesivir時，您的醫生會考慮疾病的嚴重程度、兒童的年齡和體重。

生育、懷孕和母乳餵養

- Remdesivir對生育能力的影響尚不清楚。
- 關於remdesivir用於孕婦和哺乳期婦女，需要進一步的資訊。只有在認為可能得到的益處大於對母親或嬰兒的風險時，才會考慮使用。請向醫生和藥劑師諮詢以獲得資訊和建議。
- 建議在remdesivir治療期間停止母乳餵養。請向醫生和藥劑師諮詢以獲得資訊和建議。

REMDESIVIR如何給藥？

- Remdesivir由醫生或護士通過靜脈緩慢輸入體內，每天一次，通常持續5天。緩慢輸入（也稱為輸液）可能需要30至120分鐘，將在醫院環境中進行。
- 您的醫生會決定適合您的劑量和給藥次數。

我的筆記：

關於REMDESIVIR的更多資訊

- Gilead Sciences Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information – Veklury® (Remdesivir) Concentrate for Injection. Therapeutic Goods Administration. Published July 2020. <https://search.tga.gov.au/s/search.html?query=remdesivir&collection=tga-artg&profile=record>
- National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with COVID-19. <https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines>

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of New South Wales (NSW Health).

免責聲明：本檔只是提供資訊。這些資訊在本文發表時是有效的，但可能會定期更新，患者、照顧者和家屬個人需要使用時建議從NSW TAG網站下載該檔。文中並沒有包括所有的現有資訊，並不打算取代醫療建議，不應該單單依靠這個文檔來作出實際的治療選擇或作出其他決定。