

USE OF TOCILIZUMAB IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19**DÙNG THUỐC TOCILIZUMAB
NƠI CÁC BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO COVID-19****THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC**

Tập thông tin này gồm có thông tin quan trọng về thuốc tocilizumab khi được dùng trong việc chữa trị COVID-19.

ÍCH LỢI TIỀM TÀNG CỦA TOCILIZUMAB TRONG VIỆC CHỮA TRỊ COVID-19?

Tocilizumab thuộc về một nhóm thuốc gọi là kháng thể đơn dòng. Kháng thể đơn dòng là các protein, mà đặc biệt nhận ra và gắn kết vào các protein đặc biệt trong cơ thể để chỉnh sửa cách làm việc của hệ miễn dịch. Tocilizumab giúp giảm ảnh hưởng của một hệ miễn dịch kích hoạt quá mức mà có thể xảy ra nơi ca nhiễm COVID-19 trầm trọng. Thuốc này rất có thể giúp giảm nguy cơ tử vong.

Tocilizumab đã được chuẩn nhận tại Úc để chữa trị một số bệnh trạng miễn dịch chẳng hạn như viêm khớp (arthritis), hội chứng phóng thích cytokine, và viêm động mạch tế bào khổng lồ. Tên thương hiệu của thuốc là Actemra®.

Các thử nghiệm lâm sàng gần đây đã khảo sát tocilizumab tác dụng hữu hiệu ra sao nơi các ca COVID-19. [National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce](#) (Lực lượng Chứng cứ Lâm sàng COVID-19 Toàn quốc) của Úc đã khuyến nghị về việc khi nào thì tocilizumab rất có thể hữu hiệu hoặc không hữu hiệu trong việc chữa trị COVID-19.

NHỮNG GÌ NÊN XÉT ĐẾN KHI DÙNG TOCILIZUMAB NƠI CA NHIỄM COVID-19?

Bởi vì việc sử dụng tocilizumab đối với COVID-19 là mới và tocilizumab chưa được đăng ký để chữa trị COVID-19 tại Úc, thông tin về việc thuốc này hữu hiệu và an toàn ra sao đang được thu thập. Điều quan trọng là bệnh nhân và người chăm sóc hiểu được khi nào và tại sao tocilizumab có thể hữu ích. Bác sĩ của quý vị sẽ cung ứng thêm thông tin về việc thuốc này công hiệu và an toàn ra sao đối với bệnh trạng của quý vị.

Bởi vì việc dùng tocilizumab đối với COVID-19 là mới mẻ, điều quan trọng là quý vị cần nêu lên sự ưng thuận chính thức của mình trước khi nhận tocilizumab. Quý vị luôn có thể đổi ý về việc chữa trị với tocilizumab và rút lại ưng thuận bất cứ lúc nào.

NHỮNG GÌ BÁC SĨ CẦN BIẾT TRƯỚC KHI TOCILIZUMAB ĐƯỢC DÙNG TRONG VIỆC CHỮA TRỊ COVID-19?

Bác sĩ cần biết về việc quý vị có:

- các bệnh trạng nào khác kể cả HIV hoặc AIDS, bệnh lao, viêm túi thừa đại tràng, loét bao tử, tiểu đường, ung thư, bệnh tim, tăng huyết áp hoặc bất cứ bệnh nào về thần kinh chẳng hạn như bệnh thần kinh (neuropathy)
- các phản ứng dị ứng trước đây với bất cứ thuốc nào
- tất cả thuốc men kể cả thuốc mua qua quầy và thuốc bổ sung như vitamins, khoáng chất, thảo dược hoặc thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic medicines) mà quý vị đang dùng hoặc gần đây đã dùng
- vấn đề nào về gan hoặc thận
- có thể có thai hoặc dự định có thai

CÁC TÁC DỤNG PHỤ CỦA TOCILIZUMAB GỒM NHỮNG GÌ?

Tất cả thuốc men đều có tác dụng phụ. Đôi khi các tác dụng phụ này nghiêm trọng, nhưng thường là không nghiêm trọng, và nhiều tác dụng phụ sẽ biến mất qua thời gian hoặc khi dừng chữa trị. Có thể cần đến chữa trị đối với một số tác dụng phụ. Quý vị có thể không gặp phải tác dụng phụ nào. Dưới đây là một số tác dụng phụ có thể gặp phải trong lúc chữa trị với tocilizumab. Có khả năng gặp phải các tác dụng phụ chưa biết khác của tocilizumab khi thuốc này được dùng nơi những người bị COVID-19.

Các tác dụng phụ khả hữu của tocilizumab	Nên làm gì
<ul style="list-style-type: none"> Nhiễm trùng Viêm niêm mạc dạ dày, ví dụ chướng bụng do đầy hơi, đau, nôn mửa hoặc ăn khó tiêu Nổi mẩn, ngứa ngáy Nhức đầu, choáng váng Loét miệng 	Báo cho bác sĩ hoặc y tá biết nếu các triệu chứng này xảy ra và họ có thể giúp chữa trị.
<ul style="list-style-type: none"> Huyết áp tăng Lượng bạch cầu và tiểu cầu thấp Ảnh hưởng đến gan, tụy tạng và phổi 	Bác sĩ sẽ theo dõi xem có các tác dụng phụ này, bằng cách thử máu.
<ul style="list-style-type: none"> Thủng đường tiêu hóa (ít xảy ra) 	Báo cho bác sĩ hoặc y tá biết nếu cảm thấy đau/dễ bị đau nơi bụng hoặc nôn ra máu.
<ul style="list-style-type: none"> Phản ứng trên da, phản ứng dị ứng 	Tìm giúp đỡ y tế ngay lập tức nếu các tác dụng phụ này xảy ra.

Vui lòng lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ của tất cả các tác dụng phụ khả hữu. Phần cuối của tờ thông tin này có nối kết đến thông tin phụ trội về các tác dụng phụ của tocilizumab. Ngoài ra, bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá có thể cung ứng một danh sách đầy đủ hơn về các tác dụng phụ. Có thể trực tiếp báo cáo các tác dụng phụ đến bác sĩ và/hoặc đến Therapeutic Goods Administration (Cơ quan Quản trị Sản phẩm Trị liệu) tại www.tga.gov.au/reporting-problems.

TOCILIZUMAB ĐƯỢC CHO BẰNG CÁCH NÀO?

Tocilizumab được bác sĩ hoặc y tá tiêm truyền vào cơ thể qua tĩnh mạch (truyền tĩnh mạch). Việc truyền thuốc thường lâu khoảng một giờ và sẽ được thực hiện trong bệnh viện.

Bác sĩ của quý vị sẽ quyết định liều lượng thích hợp cho quý vị, và việc quý vị cần nhận bao nhiêu liều.

CÓ CÁC ĐỀ PHÒNG ĐẶC BIỆT NÀO KHI CHỮA TRỊ VỚI TOCILIZUMAB?

Dùng với các Thuốc Khác

Tocilizumab có thể tương tác với một số thuốc khác dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng. Quý vị phải cho bác sĩ và các chuyên viên y tế khác (chẳng hạn như dược sĩ, y tá) biết về tất cả các thuốc men thường dùng hoặc dự định dùng. Các thuốc này kể cả thuốc mua qua quầy và thuốc bổ sung như vitamins, khoáng chất, dược thảo hoặc thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic medicines).

Bác sĩ và dược sĩ sẽ xem xét các tương tác khả hữu của thuốc trước khi tocilizumab được bắt đầu dùng và khi ngưng dùng.

Các chủng ngừa

Vì tocilizumab có thể làm giảm hoạt động của hệ miễn dịch, quý vị có thể bị nhiễm trùng. Bác sĩ sẽ xem xét về việc nhiễm trùng và tư vấn về việc chủng ngừa sau này cho quý vị.

Khả năng sinh sản, Thai kỳ và Cho con dùng sữa mẹ

- [National COVID-19 Taskforce](#) cung ứng một số hướng dẫn về việc sử dụng tocilizumab nơi thai phụ và phụ nữ đang cho con dùng sữa mẹ mà mắc COVID-19. Hãy hội ý với bác sĩ hoặc dược sĩ để biết thông tin và được hướng dẫn.
- Chưa được biết về ảnh hưởng của tocilizumab đối với khả năng sinh sản.
- Một cách tổng quát, phụ nữ ở độ tuổi sinh nở nên dùng phương cách ngừa thai thích hợp trong vài tháng sau khi chữa trị với tocilizumab. Hãy hội ý với bác sĩ để biết thêm chi tiết.

Ghi chú của tôi:

THÔNG TIN THÊM VỀ TOCILIZUMAB

- Roche Products Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information Actemra® (tocilizumab) (rch) 200 mg/10 mL injection concentrated vial. Therapeutic Goods Administration. Published April 2020
https://search.tga.gov.au/s/search.html?collection=tga-artg&profile=record&meta_i=149404
- National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with COVID-19. <https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines>

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of New South Wales (NSW Health).

Không nhận trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin, và hiện hành vào lúc xuất bản. Tài liệu này có thể cập nhật định kỳ và người xem nên tải tài liệu từ trang mạng của NSW TAG khi cần sử dụng cho riêng bệnh nhân, người chăm sóc và gia đình. Tài liệu này không bao gồm tất cả các thông tin có sẵn. Tài liệu này cũng không nhằm để thay thế tư vấn y tế và không nên dùng duy nhất tài liệu này để cân nhắc các quyết định hoặc lựa chọn về việc chữa trị thực sự.

This Information Leaflet is provided to support clinicians if baricitinib is used outside a trial setting.

See <http://www.nswtag.org.au/covid-19-medicines-resources/> for further details.

Page 3 of 3 | Use of tocilizumab in hospitalised adults with COVID-19 | Patient Information Leaflet | 8 Oct 2021 | Version 1.4

This resource has been endorsed by the [Victorian Therapeutics Advisory Group](#) for use by Victorian Hospitals