

USE OF SOTROVIMAB (XEVUDY®) IN ADULTS WITH COVID-19

استخدام SOTROVIMAB (XEVUDY®) للبالغين المصابين بـ COVID-19

معلومات موجزة للمرضى والعائلات ومقدمي الرعاية



ما الذي ينبغي أن يعرفه الطبيب به قبل استخدام SOTROVIMAB لمعالجة COVID-19؟

يجب أن يعرف الطبيب ما يلي:

أية حالات مرضية أخرى لديك (مثلاً: سكري/ارتفاع نسبة السكر، ارتفاع ضغط الدم، ربو).

ردات الفعل التحسسية لديك ضد أية أدوية.

جميع الأدوية التي تباع في الصيدليات أو في متاجر الأغذية الصحية، بما فيها الفيتامينات أو المعادن أو العلاجات العشبية أو الأدوية الحرجية/الشجرية التي تأخذها أو أخذتها مؤخراً. وسوف يتفقد عاملو الرعاية الصحية التفاعلات الدوائية قبل البدء بتلقي Sotrovimab وبعد التوقف عن تلقيه.

التلقيحات الأخيرة التي تلقيتها أو التي تخطط لتلقيها.

إذا كنت حاملاً أو تحاولين الحمل.

هل توجد محاذير خاصة بعلاج SOTROVIMAB؟



التلقيحات


لا توجد حالياً معلومات كثيرة عن التأثير المحتمل لـ sotrovimab على أية لقاحات أخذتها مؤخراً، بما فيها أي من لقاحات COVID-19. لكن احرص على إخبار عاملي الرعاية الصحية بأية لقاحات تلقيتها مؤخراً وأية لقاحات تنوي أخذها لاحقاً.

الخصوبة، الحمل والإرضاع من الثدي

- نظراً للمشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن أن يسببها COVID-19 للحوامل والأطفال، يمكن لحظ استعمال sotrovimab في فترة الـ 3 شهور إلى 9 شهور من الحمل. إذا كنت حاملاً، سوف يناقش معك عاملو الرعاية الصحية الذين يعالجونك قرار استعمال sotrovimab. ويؤخذ بالاعتبار جميع احتمالات تعرضك وتعرض طفلك لأذى والفوائد المحتملة لك وله.
- ليس من المعروف ما إذا كان sotrovimab يتواجد في حليب الثدي. استفسري من عامل الرعاية الصحية للحصول على معلومات ومشورة منه.
- تأثير sotrovimab على الخصوبة غير معروف.

ما هو SOTROVIMAB؟

ينتمي sotrovimab إلى مجموعة أدوية تسمى الأجسام المضادة أحادية النسيلة وقد تم تطويره لمعالجة COVID-19.



يعمل هذا العلاج عن طريق الارتباط بالبروتين الشوكي للفيروس الذي يسبب COVID-19، مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا البشرية والتكاثر في الجسم.

ما هي الفوائد المحتملة لـ SOTROVIMAB في معالجة COVID-19؟

يُمكن أن يخفّض sotrovimab من احتمالات معاناة المصاب من مرض شديد ودخوله إلى المستشفى أو وفاته إذا استُخدم خلال 5 أيام من بدء أعراض COVID-19.

يعرف عاملو الرعاية الصحية الذين يعتنون بك متى يُرجح أن يكون أو لا يكون لهذا الدواء فعالية في معالجة COVID-19.

ما الذي ينبغي أخذه بالاعتبار عند استخدام SOTROVIMAB لمعالجة COVID-19؟

نظراً إلى أن sotrovimab علاج جديد، يتم بشكل متواصل جمع المعلومات عن مدى فعاليته ومدى أمانه.

من المهم أن تعطي موافقتك الرسمية قبل أن تتلقى sotrovimab.

ويمكنك دائماً العدول عن رأيك بشأن المعالجة بـ sotrovimab وسحب موافقتك في أي وقت كان.

كيف يتم إعطاء SOTROVIMAB؟



يُعطى sotrovimab مرة واحدة فقط بحقنة تسريب في الوريد (عادةً في الذراع). يستغرق تسريب العلاج حوالي 30 دقيقة، وتبقى تحت مراقبة عامل الرعاية الصحية لمدة ساعة بعد تلقي العلاج للتأكد من عدم تعرّضك لأي رد فعل تحسّسي من جرّائه.

WHAT ARE THE SIDE EFFECTS OF SOTROVIMAB

لجميع الأدوية آثار جانبية ولكن في الغالب لا يعاني منها المريض. وفي بعض الأحيان قد تكون هذه الآثار خطيرة، ولكن في معظم الأحيان لا تكون كذلك وتزول عند توقيف العلاج، وقد يحتاج بعضها إلى معالجة. وتوجد أدناه بعض الآثار الجانبية لـ sotrovimab.

ما يجب أن تفعله	الآثار الجانبية المحتملة لـ sotrovimab
أخبر الطبيب أو الممرضة عند حصول هذه الأعراض لمساعدتك على معالجتها.	<ul style="list-style-type: none"> احمرار في الجلد أو طفح جلدي (الشرى) إسهال
أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.	<ul style="list-style-type: none"> ردود فعل غير تحسّسية أثناء تلقّي حقنة تسريب sotrovimab؛ ويمكن أن تشمل الأعراض: <ul style="list-style-type: none"> حمى (ارتفاع بالحرارة) أو قشعريرة برد، ألم أو شعور بضغط في الصدر، تسارع أو تباطؤ أو شذوذ في نبض القلب، شعور بالحاجة إلى التقيؤ، وجع في الرأس أو دوخة، تهيج الحلق أو ضيق في التنفس، حكاك وطفح جلدي.
أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.	<ul style="list-style-type: none"> ردود فعل تحسّسية، قد تشمل الأعراض ضيق في التنفس، أزيز في التنفس، صعوبة في التنفس تورّم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أعضاء أخرى من الجسم طفح جلدي شديد، حكاك، الشرى

يرجى الملاحظة: ما جاء أعلاه ليس قائمة كاملة بجميع الآثار الجانبية المحتملة، وبوسع عامل الرعاية الصحية الذي يعتني بك تزويدك بقائمة أوسع عن الآثار الجانبية. يُرجى إبلاغ عامل الرعاية الصحية بأية آثار جانبية تشعر بها.

إذا شعرت بأية آثار جانبية، بما فيها أي من الآثار الجانبية المذكورة أعلاه، أو إذا كنت تشعر بأي توجّع يُرجى الاتصال بموظف الرعاية الصحية على الهاتف المذكور أدناه للحصول على نصيحة.	
اسم موظف الرعاية الصحية للاتصال به:	
رقم الهاتف:	

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of NSW (NSW Health)

إخلاء من المسؤولية: لقد تم توفير هذه الوثيقة للمعلومات فقط، وهي سارية المفعول وقت نشرها. ويمكن تحديث المعلومات بانتظام ويُنصح بتنزيل الوثيقة من موقع NSW TAG عند لزومها لمريض أو مقدم رعاية أو أفراد عائلة. ولا تشمل هذه الوثيقة كل المعلومات المتوفرة ولا تحل محل المشورة الطبية، لذا ينبغي عدم استخدامها حصرياً لتحديد الخيارات أو القرارات العلاجية الفعلية.