

USE OF SOTROVIMAB (XEVDY®) IN ADULTS WITH COVID-19


SOTROVIMAB (XEVDY®) 在成年COVID-19患者中的应用

患者、家属与照顾者须知

什么是SOTROVIMAB?

Sotrovimab属于一组被称为单克隆抗体的药物，已研究用于治疗COVID-19。

它通过与引起COVID-19的病毒的棘突蛋白结合而发挥疗效，从而阻止病毒进入人体细胞在体内繁殖。



SOTROVIMAB治疗COVID-19的潜在好处是什么?

如果在COVID-19症状出现后5天内使用sotrovimab，可以减少患重症而入院甚至死亡的风险。

医务人员知道它在治疗COVID-19时什么时候最有效、什么时候无效。

在COVID-19中使用SOTROVIMAB时应考虑哪些因素?

Sotrovimab是新药，关于其疗效和安全性的资料还在继续收集。

在接受sotrovimab治疗之前，您必须正式表示同意。

您可以随时改变对sotrovimab治疗的看法并撤回同意。

在使用SOTROVIMAB治疗的时候，医生应该知道您的哪些情况?



医生应该知道以下情况：

- 您的任何既有疾病（如糖尿病——即高血糖、高血压、哮喘等）。
- 对药物的任何过敏反应。
- 从药店或保健品店购买的任何药物，包括您正在服用或最近服用过的维生素、矿物药、中草药。在开始使用sotrovimab治疗之前和治疗结束之后，医务人员将检查药物的相互作用。
- 最近或计划中的疫苗接种。
- 您是否怀孕或打算怀孕。

SOTROVIMAB治疗是否有特殊注意事项?

疫苗接种



关于sotrovimab对您最近接种的疫苗（包括COVID-19疫苗）的影响，目前资料不多。您最近接种和今后要接种的任何疫苗，都一定要告诉医务人员。


生育、怀孕与母乳喂养

- 因为COVID-19对孕妇和婴儿可能造成非常严重的后果，所以可以考虑在怀孕3至9个月之间使用sotrovimab。如果您怀孕了，您的主治医生会跟您讨论是否决定使用sotrovimab，对任何可能的伤害以及对您和宝宝可能带来的益处加以权衡。
- Sotrovimab是否存在于母乳中尚不清楚。相关信息和建议请向医务人员查询。
- Sotrovimab对生育能力的影响尚不清楚。

SOTROVIMAB如何给药?


Sotrovimab仅做一次静脉滴注（通常在手臂上）。

治疗大约需要30分钟，治疗后医务人员会观察一小时，确保您不会有过敏反应。



SOTROVIMAB有什么副作用?

所有的药物都可能出现副作用，但常常并不会出现。有时候会很严重，但大多数情况下并不严重，而且在停止治疗后会消失。有些副作用可能需要治疗。以下是sotrovimab的一些副作用。

Sotrovimab可能的副作用	如何处理 
<ul style="list-style-type: none"> • 皮肤发红或皮疹 • 腹泻 	如果出现这些症状，可以请医务人员帮助治疗。
<ul style="list-style-type: none"> • 用sotrovimab输液时出现非过敏反应；症状可能包括： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 发烧或发冷 ◦ 胸痛或胸闷 ◦ 心跳加快、减慢或不规则 ◦ 胃部不适 ◦ 头痛或头晕 ◦ 喉咙不适或呼吸急促 ◦ 瘙痒和皮疹 	如果出现这些症状，请立即告诉医务人员。
<ul style="list-style-type: none"> • 过敏反应；症状可能包括： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 感到呼吸短促、喘息、呼吸困难 ◦ 脸部、嘴唇、舌头或身体其他部位肿胀 ◦ 严重的皮疹、瘙痒、荨麻疹 	如果出现这些症状，请立即告诉医务人员。

请注意：这并不是所有可能的副作用的完整清单。医务人员可以提供更完整的清单。任何副作用都应该告诉医务人员。

如果您出现任何副作用，包括上面列出的任何副作用，或者在任何方面觉得不舒服，请拨打下面的电话向医务人员咨询。

 **您要与其通话的医务人员姓名：**

 **电话号码：**

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of NSW (NSW Health)

免责声明：本文件只是提供信息。这些信息在本文发表时是有效的，但可能会定期更新，患者、照顾者和家属个人需要使用时建议从NSW TAG网站下载该文件。文中并没有包括所有的现有信息，并不打算取代医疗建议，不应该单单依靠这个文件来作出实际的治疗选择或作出其他决定。

This Information Leaflet is provided to support clinicians if sotrovimab is used outside a trial setting.

See <https://www.nswtag.org.au/covid-19-medicines-resources/> for further details.

Page 2 of 2 | Use of sotrovimab in adults with COVID-19 | BRIEF Patient Information Leaflet | Version 1 | 14 October 2021

This resource has been endorsed by the [Victorian Therapeutics Advisory Group](#) for use by Victorian Hospitals

 VIC TAG
VIC THERAPEUTICS ADVISORY GROUP

 NSW TAG

NSW
Therapeutic
Advisory
Group Inc.