

USE OF SOTROVIMAB (XEVDY®) IN ADULTS WITH COVID-19


SOTROVIMAB (XEVDY®) 在成年COVID-19患者中的應用

患者、家屬與照顧者須知

什麼是SOTROVIMAB？

Sotrovimab屬於一組被稱為單克隆抗體的藥物，已研究用於治療COVID-19。

它通過與引起COVID-19的病毒的棘突蛋白結合而發揮療效，從而阻止病毒進入人體細胞在體內繁殖。



SOTROVIMAB治療COVID-19的潛在好處是什麼？

如果在COVID-19症狀出現後5天內使用sotrovimab，可以減少患重症而入院甚至死亡的風險。

醫務人員知道它在治療COVID-19時什麼時候最有效、什麼時候無效。

在COVID-19中使用SOTROVIMAB時應考慮哪些因素？

Sotrovimab是新藥，關於其療效和安全性的資料還在繼續收集。

在接受sotrovimab治療之前，您必須正式表示同意。

您可以隨時改變對sotrovimab治療的看法並撤回同意。

在使用SOTROVIMAB治療的時候，醫生應該知道您的哪些情況？



醫生應該知道以下情況：

- 您的任何既有疾病（如糖尿病——即高血糖、高血壓、哮喘等）。
- 對藥物的任何過敏反應。
- 從藥店或保健品店購買的任何藥物，包括您正在服用或最近服用過的維生素、礦物藥、中草藥。在開始使用sotrovimab治療之前和治療結束之後，醫務人員將檢查藥物的相互作用。
- 最近或計畫中的疫苗接種。
- 您是否懷孕或打算懷孕。

SOTROVIMAB治療是否有特殊注意事項？

疫苗接種



關於sotrovimab對您最近接種的疫苗（包括COVID-19疫苗）的影響，目前資料不多。您最近接種和今後要接種的任何疫苗，都一定要告訴醫務人員。


生育、懷孕與母乳餵養

- 因為COVID-19對孕婦和嬰兒可能造成非常嚴重的後果，所以可以考慮在懷孕3至9個月之間使用sotrovimab。如果您懷孕了，您的主治醫生會跟您討論是否決定使用sotrovimab，對任何可能的傷害以及對您和寶寶可能帶來的益處加以權衡。
- Sotrovimab是否存在於母乳中尚不清楚。相關資訊和建議請向醫務人員查詢。
- Sotrovimab對生育能力的影響尚不清楚。

SOTROVIMAB如何給藥？


Sotrovimab僅做**一次**靜脈滴注（通常在手臂上）。

治療大約需要30分鐘，治療後醫務人員會觀察一小時，確保您不會有過敏反應。



SOTROVIMAB有什麼副作用？

所有的藥物都可能出現副作用，但常常並不會出現。有時候會很嚴重，但大多數情況下並不嚴重，而且在停止治療後會消失。有些副作用可能需要治療。以下是sotrovimab的一些副作用。

Sotrovimab可能的副作用	如何處理 
<ul style="list-style-type: none"> 皮膚發紅或皮疹 腹瀉 	如果出現這些症狀，可以請醫務人員幫助治療。
<ul style="list-style-type: none"> 用sotrovimab輸液時出現非過敏反應；症狀可能包括： <ul style="list-style-type: none"> 發燒或發冷 胸痛或胸悶 心跳加快、減慢或不規則 胃部不適 頭痛或頭暈 喉嚨不適或呼吸急促 瘙癢和皮疹 	如果出現這些症狀，請立即告訴醫務人員。
<ul style="list-style-type: none"> 過敏反應；症狀可能包括： <ul style="list-style-type: none"> 感到呼吸短促、喘息、呼吸困難 臉部、嘴唇、舌頭或身體其他部位腫脹 嚴重的皮疹、瘙癢、蕁麻疹 	如果出現這些症狀，請立即告訴醫務人員。

請注意：這並不是所有可能的副作用的完整清單。醫務人員可以提供更完整的清單。任何副作用都應該告訴醫務人員。

如果您出現任何副作用，包括上面列出的任何副作用，或者在任何方面覺得不舒服，請打下面的電話向醫務人員諮詢。

 **您要與其通話的醫務人員姓名：**

 **電話號碼：**

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of NSW (NSW Health)

免責聲明：本檔只是提供資訊。這些資訊在本文發表時是有效的，但可能會定期更新，患者、照顧者和家屬個人需要使用時建議從NSW TAG網站下載該檔。文中並沒有包括所有的現有資訊，並不打算取代醫療建議，不應該單單依靠這個文檔來作出實際的治療選擇或作出其他決定。